

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PERIODIQUE

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

EDITION DE LA STATION POITOU - CHARENTES

CHARENTE - CHARENTE MARITIME - DEUX SEVRES - VIENNE

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

13 ROUTE DE LA FORET - BIARD - 86 000 POITIERS - TEL (49) 58 39 02

DLP 30-3-82954618



Vienne

BULLETIN N° 1 du 26 Mars 1982

Cher Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous informer que vous avez été sélectionné pour appartenir à un échantillon représentatif des céréaliers du département qui seront destinataires des AVERTISSEMENTS BLE PLUS expédiés par le Service de la Protection des Végétaux, en collaboration avec le Comité Technique Départemental.

Cette édition spéciale spécifique à la culture du BLE comportera un maximum de cinq bulletins, qui seront expédiés en fonction des risques de maladies observés. Ces bulletins sont complémentaires des Notes Techniques BLE PLUS qui sont largement diffusées, et des visites de parcelles qui sont organisées. Suivez ces conseils et, si nécessaire, consultez votre collecteur (Coopérative ou Négociant) ou les conseillers de la Chambre d'Agriculture.

Souhaitant que ces indications vous permettront de protéger efficacement vos cultures de BLE, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Le Comité Directeur
de l'opération BLE PLUS Poitou-Charentes

SITUATION DES CULTURES

Sur l'ensemble du département, la majorité des parcelles arrive au stade 1 noeud, avec cependant une légère avance des Terres de Groies par rapport aux autres types de sol.

MALADIES DU PIED

Le piétin verse est fréquent à des niveaux assez élevés sauf en Terres d'Aubues où les attaques semblent moins importantes. Il conviendra de bien surveiller les parcelles car la situation évolue rapidement surtout en Terres Rouges.

Seuls piétin verse et rhizoctone doivent être combattus. Ne pas les confondre avec la fusariose, très fréquente, sur laquelle les traitements sont sans intérêt. Pour les reconnaître, se reporter au tableau à paraître dans le note Blé Plus n° 4.

MALADIES DU FEUILLAGE

La septoriose est présente partout. L'oïdium est très fréquent sur variétés sensibles (Cocagne, Talent, Fidel) et sur les semis précoces. Le temps chaud va favoriser l'épidémie. Quelques foyers de rouille jaune sont apparus et il convient de surveiller soigneusement les parcelles cultivées avec des variétés sensibles (Talent, Fidel, Castan, Hardi,...).

La rouille brune est déjà présente sur 1/3 des parcelles semées tôt et elle évolue rapidement.

1382 n° 1-6 mg 2
.../...

P1

4° To. 40831

CONSEILS

2/

1) DANS QUELS CAS LE TRAITEMENT EST IL CONSEILLE ?

- Si plus de 20 % de talles sont attaqués par le piétin verse ou le rhizoctone : Attention au développement tardif du piétin.
- Si l'on observe de fortes attaques de rouille ou oïdium.

2) QUAND FAUT - IL PLACER LE TRAITEMENT ?

- Au stade 1 à 2 noeuds pour la lutte contre le piétin verse.
- Si le seuil de traitement du piétin verse n'est jamais atteint, attendre que les épidémies de maladies du feuillage soient déclarées sans tenir compte du stade du blé.

3) AVEC QUELS PRODUITS INTERVENIR ?

Des indications générales sur les produits sont indiquées dans les notes technique blé plus n° 4, mais on peut préciser que :

- en cas de traitement contre le piétin verse, choisir un produit également efficace sur :

- * les septorioses : dans tous les cas
- * la rouille jaune : sur variétés sensibles (Talent, Fidel, Castan, Hardi...)
- * l'oïdium : sur variétés sensibles (Cocagne...)
- * la rouille brune : sur attaque déclarée uniquement.

- en l'absence de risque de piétin verse, les traitements sur maladies du feuillage (épidémies déclarées) devront faire appel à des produits à bonne action curative. En particulier, pour la rouille brune, seuls dichlobutrazol (les VIGIL), fenpropimorphe (CORBEL) et propiconazole (les TILT) sont conseillés; les autres produits ont surtout une action préventive (en particulier le triadimefon).

Imprimé à la station le 26 mars 1982